



Tumori nasali nel cane: debulking endoscopico

Che cosa significa debulking?

È una procedura eseguita in anestesia generale che, con l'aiuto di un endoscopio, riduce la massa tumorale accessibile nelle cavità nasali. Si possono utilizzare strumenti di presa e laser. Lo scopo è alleviare sintomi come difficoltà respiratoria, rumori nasali, secrezioni e sanguinamento e migliorare la qualità di vita.

È una cura definitiva?

No. È un trattamento palliativo: riduce la quantità di tumore visibile, ma non elimina necessariamente le cellule infiltrate nei tessuti. Il tumore può ricrescere e i sintomi possono ripresentarsi. L'entità e la durata del beneficio variano da cane a cane; non si può garantire in anticipo un risultato o una durata precisa.

Perché serve la TC?

Prima di programmare la procedura è necessaria una **tomografia computerizzata (TC)** del cranio. La TC mostra quanto è estesa la malattia e se interessa strutture delicate, come la regione vicina al cervello o l'orbita. Insieme alla visita, alla diagnosi del tumore e alla valutazione anestesiológica, aiuta a stabilire se il debulking è indicato e quali aree si possono trattare in sicurezza. Una nuova TC può essere utile se i sintomi ritornano e si valuta un altro intervento.

La chemioterapia metronomica dopo la procedura

Quando appropriata, l'oncologo può proporre una terapia farmacologica a basse dosi e con somministrazione regolare, detta **chemioterapia metronomica**, con l'obiettivo di **rallentare la ricrescita** della neoplasia e prolungare il controllo dei sintomi. Richiede controlli clinici e analisi periodiche per valutarne efficacia e tollerabilità. **Non è dimostrato che riesca a ritardare la ricrescita in ogni cane:** la risposta individuale può essere molto diversa.

Da cosa dipende il risultato?

Contano il tipo e l'estensione del tumore alla TC, la parte raggiungibile per via endoscopica, le condizioni generali del cane, la risposta individuale alla procedura e l'eventuale risposta alla terapia oncologica. Il team discuterà il piano più adatto e le alternative, compresa la radioterapia quando praticabile.

Cosa aspettarsi dopo

Sono necessari controlli programmati per valutare respirazione, secrezioni, eventuale sanguinamento e qualità di vita. Possono verificarsi sanguinamento o altri problemi legati alla sede trattata e all'anestesia; i rischi specifici saranno spiegati dopo la TC. Se i sintomi ricompaiono, si rivaluta il paziente e, in casi selezionati, si può considerare una nuova procedura.

Approfondimento scientifico: Bottero E. e coll., "Palliative endoscopic debulking treatment of canine nasal carcinoma — 35 cases: A retrospective multicentric study". I dati pubblicati descrivono un gruppo di cani e non prevedono l'esito del singolo paziente.