

Approccio diagnostico e nutrizionale nel cane enteropatico cronico

SEGNII DIGESTIVI DA PIÙ DI 3 SETTIMANE

ESCLUDERE

ESEGUIRE

Dieta

suggerimento nutrizionale



Giovane

< 2 anni

Nausea / vomito

Diarrea del colon

Nessuna perdita di peso

1 **ESCLUDERE** Malattie parassitarie / protozoarie (*Giardia*)

ESEGUIRE Terapia *ex adjuvantibus* (fenbendazolo)

↓ *sintomi persistenti*

2 **ESCLUDERE** Forme dieta-responsive

ESEGUIRE Almeno 2 trial dietetici

Idrolisato Proteina novella Iperdigeribile ↑ Tenore di fibra

↓ *sintomi persistenti*

3 **ESCLUDERE** Malattie metaboliche / endocrine, anomalie gastroenteriche

ESEGUIRE **Esami di laboratorio:** emocromo, biochimico, esame feci, urine, cortisolo basale, TLI, folati, B12, acidi biliari

Diagnostica per immagini: ecografia addominale

↓ *sintomi persistenti*

4 **ESEGUIRE** Trial probiotico / simbiotico · trapianto del microbiota fecale

Idrolisato Proteina novella Low fat

↓ *sintomi persistenti*

5 **ESEGUIRE** **Esame endoscopico e istologico**

Pazienti gravi, enteropatie proteino-disperdenti

Adulto / anziano

> 2 anni

Nausea / vomito

Diarrea

Perdita di peso

1 **ESCLUDERE** Forme dieta-responsive

ESEGUIRE Almeno 2 trial dietetici

Idrolisato Proteina novella Iperdigeribile

↓ *sintomi persistenti*

2 **ESEGUIRE** Trial probiotico / simbiotico · trapianto del microbiota fecale

↓ *sintomi persistenti*

3 **ESEGUIRE** **Esame endoscopico e istologico**

↓

4 **ESEGUIRE** **Terapia farmacologica mirata**

INQUADRA IL CODICE
www.endovetroma.it

