

Gestione a casa dopo la dimissione

Il paziente viene dimesso quando è sveglio e in condizioni compatibili con il rientro a casa. L'orario può variare in base al recupero dall'anestesia.

PRIORITÀ

Seguire sempre le indicazioni consegnate alla dimissione: una procedura interventistica o condizioni cliniche particolari possono richiedere istruzioni diverse o ospedalizzazione.

Acqua e cibo: riprendere gradualmente

1	Attendere	Salvo diversa indicazione, non offrire acqua o cibo nelle prime 3 ore dopo la procedura.
2	Provare con poca acqua	Offrire una piccola quantità, appena il fondo della ciotola. Se viene trattenuta, ripetere ogni 15 minuti per circa un'ora.
3	Offrire poco cibo	Dopo un'ora senza vomito, proporre una piccola porzione dell'alimento abituale. Continuare con pasti piccoli e frequenti per la serata.
4	Se non vuole bere	Soprattutto nel gatto, dopo almeno 4 ore dalla procedura si può provare con una piccola quantità di cibo, se il paziente è ben sveglio e non presenta nausea.

Se compare vomito

Sospendere acqua e cibo. Se si tratta di un singolo episodio e il paziente resta vigile, attendere 2 ore prima di riprovare con pochissima acqua. Contattare il veterinario in caso di vomito ripetuto, sangue, forte nausea o peggioramento.

Cosa può essere normale nelle prime ore

- Lieve sonnolenza o minore appetito, con progressivo miglioramento.
- Modesto fastidio addominale, aria intestinale o feci temporaneamente più morbide dopo endoscopia digestiva.
- Piccole tracce di sangue dal naso dopo biopsie nasali o nelle urine dopo cistoscopia/biopsie, solo se previste e di lieve entità.

Quando contattare subito un veterinario

RESPIRAZIONE FATICOSA	ABBATTIMENTO MARCATO
Respiro a bocca aperta, mucose bluastre o incapacità a riposare.	Difficoltà a svegliarsi, debolezza crescente, collasso o disorientamento.
VOMITO RIPETUTO O SANGUE	DOLORE O SANGUINAMENTO IMPORTANTE
Vomito che continua, sangue nel vomito o impossibilità a trattenere acqua.	Dolore intenso, addome molto teso, sanguinamento abbondante o che non si riduce.

A casa

Tenere il paziente in un ambiente tranquillo, tiepido e sicuro. Evitare scale, salti, passeggiate lunghe e giochi vivaci fino al completo recupero. Somministrare solo i farmaci indicati alla dimissione.